

注射

薬効	品名	一般名	規格・単位	常用量	
麻酔剤					
(毒薬)非脱分極性麻酔用筋弛緩剤	エスラックス静注50mg	ロクロニウム臭化物	50mg/5.0mL	0.6mg/kg (3.0mg/50kg, 3.0ml/50kg)	
筋弛緩回復薬	ブリアイオン静注	スガマデクスナトリウム	200mg/2mL		麻酔科Drの指示によりブリアイオンに変更
副交感神経興奮剤	ワゴスチグミン注0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩・ネオスチグミンメチル硫酸塩	1ml		
静脈麻酔剤	チゾール0.5g	チアマールナトリウム	500mg1管		重症気管支喘息の患者 禁忌
	プロポフォール Propofol	プロポフォール	200mg20mL1管	鎮静薬 中枢神経抑制作用 全身麻酔の導入薬として用いる場合には、1-2mg/kg (50-100mg/50kg, 5-10cc/50kg)を静注します。 気管支喘息の既往のある患者にthiamylalを避け、propofolを用いる麻酔医が多いようです(※thiamylal(Isozolイソゾール)やthiopental(ラボナール)が気管支喘息に対して危険であると裏付ける文献は乏しいようです)。	
局所麻酔剤	セボフレン	セボフルラン	250ml		
	キシロカイン注射液	塩酸リカイン	1%100ml		
	キシロカインボリアンブ	塩酸ジブカイン	1%10ml		
	ネオヘルカミンS	塩酸ジブカイン	7.2mg、3ml		
	マーカイン	塩酸プロピバカイン	高比重0.5%、4ml	1回10~20mg	
長時間作用性局所麻酔剤	アナペイン注7.5mg	ロピバカイン塩酸塩水和物	20ml		購入中止
	アナペイン注2mg		200mg/100ml × 1バッグ 20mg/10mL		
鎮痛剤	ロピオン	フルルビプロフェン アキセチル	1アンプル(5mL)	1回50mgをできるだけゆっくり静脈内注射	
	レベタン注0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	1ml		購入中止
	アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン	1袋100mL	1回300~1000mg	
麻酔用鎮痛剤	フェンタニル注0.1mg	フェンタニルエン酸塩	0.1mg、2mL		麻薬
脳下垂体後葉ホルモン剤	ピトレシン注射液20	合成バソプレシン	1ml		
抗不安薬	セルシン注射液	ジアゼパム	10mg2ml	1回10mg 筋、静注	

子宮用剤

ホルモン療法薬	リュープリン注射用キット	酢酸リュープロレリン	1.88mg 3.75mg	4週に1回1.88mg皮下注体重の重い人、子宮膨大の人は3.75mg投与、初回は月経1~5日目に行う	
	ゾラデックス1.8mgデポ	酢酸ゴセレリン	1.8mg	4週に1回1.8mg又は3.6mg皮下注	
	スプレキュアMP1.8	酢酸ブセレリン	1.8mg	1か月に1回1.8mg皮下注	在庫ナシ
	マイリス注	プラステロン硫酸ナトリウム	200mg1瓶	1日1回100~200mg注射用水又はブドウ糖注射液にて100mg/10mlの濃度とし、妊娠末期の妊婦に週2~3回静注	製造中止
子宮運動抑制剤	ウテミン	塩酸リトリン	注: 50mg	50mgを500ml注射液に希釈し、50μg/分で点滴開始有効用量は50~150μg/分毎分200μgまで	
	マグネゾール	硫酸マグネシウム	20ml	1回20mlを徐々に静注	
	マグセント	硫酸マグネシウム、ブドウ糖配合	注:100ml	初回量40ml、20分異常かけ静注後、10ml/時より持続静注。子宮収縮が抑制されない場合:5ml/時ずつ増量、最大20ml/時まで <u>高マグネシウム血症</u>	子宮収縮
蛋白分解酵素阻害薬)	ミラクリット	ウリナスタチン	5万単位		切迫流早産、頸管炎使用。保険適用外。に
子宮用剤	パルタンM	マレイン酸メチルエルゴメリン	0.2mg、1ml	1回0.1~0.2mgを静注又は1回0.2mgを皮下、筋注	

大川産婦人科病院常用薬品集

日付:R03.06.01

青色:最近採用薬品

緑色:在庫なし薬品

ナリ収額別	プロスタルモン・F1000	ジノプロスト	1000μg、1ml		気管支喘息の既往のある患者に 禁忌
たん白アミノ酸製剤	12%イソール注射液	12%アミノ酸製剤	12%200ml	1回20～500mlを静注、点滴静注 1分間に30～40滴	
ブドウ糖製剤	大塚糖液5%	ブドウ糖注射液	20ml×50A		
	大塚糖液5%	ブドウ糖注射液	100ml×10Pb		
	5%大塚糖液	ブドウ糖注射液	500ml×20Pb		
	大塚糖液20%	ブドウ糖注射液	20ml×50A		
	大塚糖液10%	ブドウ糖注射液	20ml×50A		
	5%精注シリンジ	ブドウ糖注射液	20ml×10シリンジ		
血液代用剤	大塚生食注	生理食塩液	20ml×50A		
	大塚生食注(細口開 栓プラグ付)	生理食塩液	500ml		
	テルモ生食	生理食塩液	100ml×20Pb 500ml×20Pb 1000ml×10Pb		
	ラクテックG輸液	乳酸リンゲル液	500ml×20Pb		
	ラクテック注	乳酸リンゲル液(マルトース 加)	500ml×20Pb		
	ポタコールR輸液	乳酸リンゲル液(マルトース 加)	500ml×20Pb		
	フィジオ35	無機塩類(ブドウ糖加)	500ml×20Pb		
	KN3号輸液	乳酸Na,無機塩類、糖 類	500ml×20Pb		
	ヘスパンダー	ヒドロキシエチルテンパン	500ml×10Pb		出血多量時(緊急時使用)デキストランより変 更
たん白アミノ酸製剤	ラエンネック	胎盤加水分解物	2ml		
補正用製剤	メイロン	炭酸水素ナトリウム	7%、20ml		
視床下部ホルモン	LH-RH	酢酸ゴナドレリン	検査用 注:0.1mg1ml	1回0.1mg	
	TRH	プロチレリン	0.5mg、1ml	TRH分泌機能検査:1回0.5mg プロラクチン分泌機能検査:1回0.1～ 0.5mg	
下垂体後葉ホルモン	アトニン-O5単位	オキシトシン	5単位1ml	5～10単位、点滴静注	

大川産婦人科病院常用薬品集

日付: R03.06.01

青色: 最近採用薬品

緑色: 在庫なし薬品

性腺刺激ホルモン	ヒュゴン		150単位1管	1日75~150IU. 筋注	
HMG HCG 製剤	フェルティノーム-P		75IU. U	1日75~150IU連続皮下、筋注	
	パーゴグリン注		150単位1管	1日75~150IU. 筋注	
	HMG「テイゾー」		75,150単位1管		FSH:LH=1:1
	HMG「あすか」		75,150単位1管		FSH:LH=1:1HMG「テイゾー」から名称変更
	HMG「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン	75,150単位1管		FSH:LH=1:1
	HMG「F」		75,150単位1管		FSH:LH=1:1/3 富士製薬工業
	HMG「コーク」		75,150単位1管		FSH:LH=1:<0.05
	HMG「TYK」		75,150単位1管		FSH:LH=1:<0.05HMG「コーク」から名称変更,製造中止
	ゴナピュール		75,150単位1管		FSH:LH=1:<0.0053
	uFSH「あすか」		75,150単位1管		FSH:LH=1:<0.0053ゴナピュールから名称変更
	フオスチム	フオイトピンベータ	75単位0.5ml	1日150~225IU.4日間皮下又は筋注. その後1日75~375IU.6~12日間	日本オルガノン社 遺伝子組み換え型
	ゴナルエフ	ホルイトロピン アルファ	75IU 150IU		メルクセローノ
	ゴナルエフ ペン		300IU 450IU		
	HCG7ジセイヤク	胎盤性性腺刺激ホルモン	3000単位1管 5000単位1管	1回300~10000単位筋注	
GnRHアンタゴニスト製剤	ガニレスト皮下注	ガニレリクス酢酸塩	皮下注0.25mg シリンジ		
	レルミナ錠	レルゴリクス	錠:40mg	40mgを1日1回食前	(内服)原子宮筋腫治療薬
止血薬	トランサミン注10%	トナネキサム酸	10%10ml	1日250~500mg、1~2回分割、筋注、静注,必要に応じ1回500~1000mg静注又は500~2500mg点滴静注	
	レパチラーゼ=S注	ヘモコアクラーゼ	1単位1ml	1日1~2単位、筋、静注	製造中止
	アトナ注	カルバゾクロム スルホン酸ナトリウム	50mg10ml	1日25~100mg静注	

大川産婦人科病院常用薬品集

日付: R03.06.01

青色: 最近採用薬品

緑色: 在庫なし薬品

血液凝固阻止剤	フラグミン静注	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶		禁: 妊婦
	カプロシン皮下注		20,000単位1瓶	術後血栓予防例: 1日2回各5000/5000/5000/2500/2500	
	ヘパリンカルシウム皮下注	ヘパリンカルシウム	1シリンジ(0.2mL)中5,000単位	1日2回、12時間間隔で皮下注射	
	ヘパリンナトリウム注1万単位	ヘパリンナトリウム	1瓶(10mL)10000単位		
	ヘパリンNaロック10シリンジ	ヘパリンナトリウム	50単位5ml		
	クレキサ	エノキサパリンナトリウム	皮下注(キット)2000IU、0.2mL	1回2000IU、12時間毎に1日2回連日皮下注	
	オルガラン	ダナパロイドナトリウム	1250単位1ml	1回1250単位を12時間毎静注。1日量2500単位	
抗ヒスタミン薬	アタラックス-P注	ヒドロキシジン	2.5%1ml	筋注:1回50:~100mg4~6時間毎 静注:1回25:~50mg4~6時間毎	術前・術後の悪心、嘔吐防止
	ホラミン注	d-メレイン酸クロルフェニラミン	5mg、1ml	1回5mg、1日1回	
鎮けい剤	ブスコパン注射液	臭化ブチルスコホラム	2%1ml	1回10~20mg皮下筋注、静注	
カリウム製剤	コンクライト液-K1メック	塩化カリウム	注:20ml		劇毒

抗菌剤

広範囲ペニシリン系	ペントシリン静注	ピペラシリンナトリウム	1g	1日2~4g、2~4回分割	
	ピクシリン注	アンピシリンナトリウム	1g	初回量2g、以後6時間毎1gを分娩まで静注	GBS(+)有効
第一世代セフェム系	セファジンα	セファゾリンナトリウム	1g	1日1~3g、2~3回分割	GBS(+)でペニシリン禁に初回量2g、以後8時間ごと1gを分娩まで静注
第三世代セフェム系	ロセフィン静注	セフトリアキソンナトリウム	1g	1日1~2g、1回又は2回分割	
	ノイセフ静注用	セフゾンジムナトリウム	静注用1g	1日1~2g、2回分割	淋菌ノイセフ1g div or セフゾン3/3×5日 製造中止
第四世代セフェム系	マキシピーム	塩酸セフェピム	1g	1日1~2g、2回分割	
ホスホマイシン	ホスシシS	ホスホマイシンナトリウム	静注用:1g	1日2~4g、2~4回静注	
アミノグリコシド系	イセパマイシン	硫酸イセパマイシン	400mg2ml	1回400mg、 1日1~2分割筋注	
	ロミカシ	硫酸アミカシ	200mg	1回100~200mg、 1日1~2回	
	ハベカシ	硫酸アルベカシ	100mg2ml	1日1回(2回)150~200mg 点滴静注30~120分(筋注も)	MRSAに有効 期限切れにて在庫なし
テトラサイクリン系	ミノマイシン	塩酸ミノサイクリン	100mg	初回100~200mg、以後12~24時間毎に100mg	必要時発注する
ニューキノロン系	パズクロス注500	メシル酸パズクロキサシ	500mg100ml	1日1000mg~600mg、2回分割	原則として第一選択薬としての使用を避けること
抗ウイルス薬	ゾピラックス	アシクロビル	点滴静注用: 250mg	1回5mg/kg、1日3回、8時間毎 7日間点滴静注	必要時発注する
造血薬	フェリコン	シデフェロン	50mg2ml	1日50~100mg	製造中止
	フェジン静注	含糖酸化鉄	40mg2ml	1日40~120mg(2~6mL)	
消化性潰瘍治療薬	硫酸アトピン	硫酸アトピン	0.5mg、1ml	1回0.5mg皮下、筋注、静注	

大川産婦人科病院常用薬品集

日付: R03.06.01

青色: 最近採用薬品

緑色: 在庫なし薬品

ホルモン製剤

男性ホルモン剤	テストノン・デポ	エナト酸テストステロン	125mg 1ml		在庫なし
黄体・卵胞ホルモン剤	ルテストホ	カプロン酸ヒドロキシプロゲステロン125mg、安息香酸エストラジオール10mg	油性注1ml	1回1ml筋注	
卵胞ホルモン剤	プロキノン・デポ	吉草酸エストラジオール	油性注:10mg 1ml	1回5~10mg、1~4週毎筋注	Progynon-depot
黄体ホルモン剤	プロゲステンデポ-S	カプロン酸ヒドロキシプロゲステロン	125mg1管	1週1回65~125mg筋注	
	プロゲステン注50	プロゲステロン注射液	50mg1管		
男性・卵胞ホルモン混合製剤	エスジン・デポ	テストステロン・エストラジオール 配合剤	1ml1管		製造中止
	プリモジアン・デポ	吉草酸エストラジオール・エナト酸テストステロン	油性注:1ml	1回1ml、2~4週毎筋注	エスジンデポの後 Primodian-depot
LH-RH、TRH負荷試験	LH-RH注0.1mg「タナベ」				注射前(基礎値)採血し(LH、FSH、PRL測定)、LH-RH注0.1mg「タナベ」+TRH注0.5mg「タナベ」+20ml生食をゆくり静注して、15分後に採血してLH、FSH、PRLを測定
	TRH注0.5mg「タナベ」	下垂体に作用し、TSHとPRLの分泌を促進			
副腎皮質ステロイド	ソル・コーテフ	コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム	100mg 500mg	1回50~100mg、1日1~4回静注、点滴静注、筋注など	
	デカロン注	デキサメタゾン	(リン酸デキサメタゾン8mg)2mlバイアル 2mg(0.4%)0.5ml1管		胎児肺成熟促進
	リンデロン注	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	4mg(0.4%)1ml1管		胎児肺成熟促進 3A(ベタメタゾン12mg)を24時間毎計2回

ビタミン

ビタミン薬	パントシン	パンテチン	200mg 2ml	血液疾患、術後腸管麻痺1日200mg、1~2回分割皮下、筋注、静注	
ビタミンB薬	アリナミンF50注	フルスルチアミン	50mg20ml	1日5~100mg静注	購入中止
混合ビタミンB群	アリアロン3B	B1、B6、B12混合	10ml1管	1日1瓶静注	
	ジアイミックス	B1、B6、B12混合	10ml1管	1日1瓶静注	
ビタミンC	シーパラ	B1、B2、B6、ニコチン酸アミド、パンテノール、C混合	2ml	1日2~10ml、1~3回分割皮下、筋注、静注	主にプラセンタ療法に使用購入中止
	シータック注	アスコルビン酸注射液	500mg、2ml		製造中止
	アスコルビン酸注	アスコルビン酸注射液	500mg、2ml		
カルシウム剤	カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム calcium gluconate	5ml1管	心臓や呼吸に影響が出ている高マグネシウム血症に。 カルチコール15-20mL (Ca 118-196mg) +5%ブドウ糖液 100mLを1時間で落とす。 カルシウムがマグネシウムに拮抗するため、症状はすぐに改善することが多い。	大日本住友製薬 詳細
昇圧薬	エホチール1%	塩酸エチレフリン	10mg 1ml	1回2~10mg皮下、筋注静注	
	エフトリン注	塩酸エフトリン	40mg、1ml	1回4~40mg静注、筋注	胎盤、子宮血流を障害しない昇圧剤
強心薬	ジギラノゲンC	デスラノド	0.4mg、2ml	小児:急速飽和療法:1日新生児・未熟児0.03~0.05mg/kg、3~4回に分割静注、筋注。2回で飽和し以後維持量とする維持量:飽和量の1/4を静注、筋注	
	ネオフィリン	アミノフィリン	250mg、10ml	1回250mg1日1~2回静注、または点滴静注	
不整脈用剤	リカイン静注用(キシロカイン)	塩酸リカイン	2%、5ml		
降圧剤	ペルジピン	塩酸ニカルジピン	10mg、10ml		

大川産婦人科病院常用薬品集

日付: R03.06.01

青色: 最近採用薬品

緑色: 在庫なし薬品

	アプレゾリン	塩酸ヒドラジン	20mg	1回20mg筋、静注	
ショックに使用・強心、血圧上昇、気管支拡張薬	ホスミン	アドレナリン	1mg 1ml	1回0.2~1mg皮下注・筋注	
	エピペン		2mg 2ml(0.3mg製剤)	1回0.3mg筋注	
解毒薬	チオクタン	チオク酸	25mg、5ml	1日1回10~25mg静注必要に応じて皮下、筋注可	製造中止
胃腸機能調整薬	プリンペラン	メクログラミド	10mg、2ml	1回10mg1日1~2回筋、静注	
H2受容体拮抗薬	ガスター	ファモチジン	20mg、2mL	1回20mg1日2回筋、静注	
肝機能改善薬	強力ネオミノファーゲンシー	グリチルリチン製剤	20ml	1回5~20mg静注	
蛋白分解酵素阻害剤	レミナロン	メシル酸ガベキサート	500mg		汎発性血管内血液凝固症(DIC)製造中止
	ガベキサートメシル酸塩注射液				汎発性血管内血液凝固症(DIC)
鎮痛薬	ペンタジン	塩酸ペンタジン	15mg、1ml	1回15mg皮下、筋注必要に応じて、3~4時間毎に反復注射(増減)	製造中止
	ソセゴン				
血液製剤	抗D人免疫グロブリン-Wf	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1000倍	分娩後72時間以内に1000倍を注射用水2mlに溶解し筋注	
	ヘプスブリン	抗HBs人免疫グロブリン	200単位1ml	新生児のB型肝炎:100~200単位筋注、生後5日以内投与	新生児のB型肝炎予防
			1000単位5ml	1回:1000~2000単位筋注	
静注用ヘプスブリン-IH	抗HBs人免疫グロブリン	1000単位5m	1回:1000~2000単位静注	針刺し事故に使用	
予防接種	ビームケン	組換え沈降B型肝炎ワクチン	0.5ml	1回0.5ml、4週間隔で2回、さらに20週~24週後、1回0.5ml、皮下注又は筋注	
	ヘプタバックス-II	組換え沈降B型肝炎ワクチン	水性懸濁注射液0.5mL	0.5mlを事故発生後7日以内に皮下又は筋注。さらに0.5mlを初回注射の1ヵ月後および3~6ヵ月後に同様注射	
子宮頸癌ワクチン	サーバリックス	HPV-16型及び18型	0.5mL	10歳以上の女性に、通常、1回0.5mLを0、1ヵ月後、6ヵ月後に3回、上腕の三角筋部に筋肉内接種	
	ガーダシル	HPV-6、11、16及び18型	0.5mL	9歳以上の女性に、1回0.5mLを合計3回、筋肉内に注射する。通常、2回目は初回接種の2ヵ月後、3回目は6ヵ月後に同様の用法で接種	尖圭コンジローマにも有効

大川産婦人科病院常用薬品集

日付:R03.06.01

青色:最近採用薬品

緑色:在庫なし薬品

非イオン性 子宮卵管造影剤	イソピスト注300	イオトロラン	1 瓶(10mL) 中、イオトロ ラン 6407.5mg含有	1 回 6 ~10mLを導管より子 宮腔内に注入	ヨード濃度(mg/mL)300
------------------	-----------	--------	---	-----------------------------	-----------------